

## Donar medicació amb seguretat al nostre fill



### Com a norma general :

- S'ha de mantenir la medicació fora de l'abast dels nens .
- Mantingui la medicació en el seu envàs , amb l'etiqueta en bon estat, i assegurant que que ben tancat l'envàs.
- Deu realitzar els tractaments respectant les quantitats , dosi i durada que li han recomanat .
- No prengui medicació d'un altre nen o d'un altre adult.
- No utilitzeu medicaments caducats
- Davant qualsevol dubte de dosificació deu consultar el metge



### Per donar-li la medicació al seu fill :

- Comprovi en medicaments líquids que la medicació té la dosi , concentració exacta.
- Utilitzeu xeringues mesurant la quantitat exacta. En el cas de ser quantitats petites utilitzi xeringues de 1-2 mil·lilitres per poder mesurar amb més exactitud .
- Per mesurar amb exactitud tingui en compte que la goma negra de l'èmbol s'ha d'alinear amb la quantitat que deu carregar
- No utilitzeu culleres de cuina.
- No barregi medicaments si no ho han indicat
- No prepari la medicació amb poca llum , per reduir el risc d'equivocacions
- Per donar-li la medicació introdueixi la xeringa a la boca i deixi succionar poc a poc
- Deu fer-li saber que els medicaments l'ajudaran a millorar i **que no són caramels ni v**
- Feliciteu al seu fill si s'ha pres de forma correcta la medicació .
- Ofereixi al seu fill aigua o algun líquid per treure-li el mal gust del medicament .
- Si escup la presa , espereu 10 minuts i provi de nou
- Renti la xeringa després amb aigua calenta. No han de quedar restes de medicament



### ACUDEIXI A URGÈNCIES O CONSULTEU AL METGE DE FORMA IMMEDIATA :



- **Davant ingestió accidental de medicació o presa de dosi errònia**
- **Si presenta alguna reacció després de la presa del medicament**
- **Ha de sempre indicar què ha pres , porti el medicament**