




INFORMACIÓN PARA PACIENTES EN TRACTAMIENTO CON HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR

DEBE SABER

- Tiene que seguir un tratamiento que actúa sobre la coagulación de la sangre. Su administración consiste en la inyección de unos viales que comprará Preparados.
- La zona de administración más habitual es en el abdomen, evitando la zona umbilical, pero debe saber que existen otras zonas en las cuales se puede administrar. Alterne las zonas de punción.

CÓMO SE ADMINISTRA

- Lávese las manos antes de la inyección.
- Desinfecte la zona donde vaya a pinchar, con algodón y alcohol.
- Coja un pliegue (“pellizco”) o pinche en un ángulo de 45-90°.
- Presione lentamente el émbolo, sin dejar ir el pliegue, para inyectar el contenido .



- No dejar ir el pliegue hasta sacar la aguja
- Después de la aplicación, pase por la zona suavemente un algodón seco.
- Después de la administración, no frote la zona, ya que esto favorece la aparición de hematomas.

RECOMENDACIONES

- Deberá ir alternando costado de las inyecciones respecto al día anterior para mantener la piel en un correcto estado
- Se recomienda la aplicación de Thrombocid® con un suave masaje en los posibles hematomas que puedan aparecer
- No pinchar nunca sobre hematoma.
- La jeringa precargada está lista para ser utilizada, es recomendable NO manipular su contenido antes de la administración.
- Deberá seguir las indicaciones médicas en cuanto a la dosis y la frecuencia de su aplicación
- Es importante que la inyección se administre siempre a la misma hora del día. Si olvida alguna dosis, en la siguiente toma sólo debe inyectarse la que le tocaría y no doblarla en ningún caso
- Si tiene que acudir a la consulta de algún especialista, dentista, etc. informo que se administra heparina.
- Tenga en cuenta que, después de una caída o un golpe, puede sangrar más y presentar hematomas.

DEBE EVITAR

- La toma de ácido acetilsalicílico o medicamentos que lo contengan (consulte a su médico).

SIGNOS DE ALERTA



Acuda al Servicio de Urgencias o consulte a su médico en el caso de:

- Sangrado nasal, en orina o en las heces.
- Hemorragias excesivas que no ceden después de unos minutos de presión en la zona.
- Presencia de grandes hematomas en la zona de punción.



PARA CONTACTAR CON NOSOTROS

Hospital General de Catalunya

Tfn. 935656000 Ext.5485

Lunes y viernes : 9-11h

Accesos a video de cómo administrarse la heparina:

https://drive.google.com/file/d/0B_JQIT9d-YaeYWpidDNHM2InZ00/view?usp=sharing

