

## UNITAT DE TRACTAMENT ANTITROMBÒTIC UTA-BST I SERVEI DE NEUROLOGIA COM DETECTAR UN ICTUS


Aquest document proporciona informació sobre com detectar una trombosi. A través d'una sèrie de preguntes i respostes, pretén solucionar alguns dels dubtes més freqüents. Es tracta d'una informació addicional, complementària a l'aportada pel metge en la consulta.

### 1.- QUÈ ÉS UN ICTUS?

Un ictus és una lesió cerebral produïda per la falta de reg sanguini, normalment arterial. Existeixen dues formes de presentació:

- L'íctus hemorràgic, en el que se produeix la ruptura d'un vas sanguini. És el que es coneix com vessament.
- L'íctus isquèmic, en què un coàgul, normalment originat al cor o derivat de l'arteriosclerosi, provoquen l'obstrucció d'un vas sanguini.

La manca de reg pot produir dany en el teixit cerebral, amb les conseqüents alteracions del seu funcionament. Els pacients amb fibril·lació auricular, un trastorn de la contracció del cor, reben un tractament anticoagulant per fer la sang menys espessa i reduir el risc que la sang es coaguli.



## 2.- QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES DE L'ICTUS?

A la següent imatge es resumeixen els signes i símptomes que poden indicar que s'està produint un l'ictus. En cas que es presentin aquests símptomes, és important acudir **URGENTMENT** a l'hospital per valorar la possibilitat d'estar patint un l'ictus i rebre tractament.



Caiguda de la cara, alteració de la sensibilitat.



Pèrdua de força en un braç



Confusió, problemes de parla, problemes de comprensió



Mareig sense motiu aparent



Visió borrosa, alteracions en la visió



Mal de cap fort inhabitual, d'inici sobtat

## 3.- COM ES DIAGNOSTICA L' ICTUS?

Davant la sospita d'estar patint un l'ictus es poden fer diverses proves per confirmar-ho:

- Anàlisi general.
- Escàner cranial que permeti observar el si existeix isquèmia o hemorràgia.

## 4.- PER QUÈ ÉS URGENT DETECTAR UNA TROMBOSI PERIFÈRICA?


Una trombosi, especialment una simptomàtica, requereix tractament urgent per evitar el seu agreujament. En cas que la trombosi s'estengui pot afectar més venes, produir èmbols que donin lloc a l'embolisme pulmonar o alterar el funcionament d'altres òrgans. Els quadres de embolisme pulmonar poden arribar a ser molt greus en cas de no rebre tractament. Serà necessari prendre anticoagulants.

És important per tant el diagnòstic i l'inici del tractament.



Per contactar amb nosaltres davant dubtes i consultes: 93 565 6000

Generalitat de Catalunya  
Departament de Salut  
Hospital acreditat per la Generalitat de Catalunya com a centre d'atenció hospitalària aguda, d'acord amb el Decret 5/2006 de 17 de gener.



Xarxa Catalana Hospitals Sense Fum