

Dar medicación con seguridad a nuestro hijo


Como norma general:

- Debe de mantenerse la medicación fuera del alcance de los niños.
- Mantenga la medicación en su envase, con la etiqueta en buen estado, y debe asegurarse de cerrar bien el envase.
- Debe respetar la dosis, duración... del tratamiento que le han recomendado.
- No automedique a su hijo. No debe darle tratamiento de otro niño ni tampoco de un adulto.
- No utilice medicamentos caducados
- Ante cualquier duda de dosificación, debe de consultar al médico.



Para darle la medicación a su hijo:

- Compruebe en medicamentos líquidos que el fármaco tiene la dosis, concentración exacta.
- Utilice jeringuillas midiendo la cantidad exacta. En el caso de ser cantidades pequeñas utilice jeringuillas de 1-2 mililitros para poder medir con más exactitud.
- Para medir con exactitud tenga en cuenta que la goma negra del émbolo debe alinearse con la cantidad que debe de cargar.
- No use cucharas de cocina.
- No mezcle medicamentos si no se lo han indicado
- No prepare la medicación con poca luz, para reducir el riesgo a equivocarse.
- Para darle la medicación introduzca la jeringuilla en la boca y deje que succione poco a poco.
- Debe de hacerle saber que los medicamentos le ayudarán a mejorar y **que no son caramelos ni vitaminas.**
- Felicite a su hijo si se ha tomado de forma correcta la medicación.
- Ofrezca a su hijo agua o algún líquido para beber tras tomar el fármaco y de este modo quitarle el mal sabor del medicamento.
- Si escupe la toma, espere 10 minutos y pruebe de nuevo.



ACUDA O URGENCIAS O CONSULTE AL MÉDICO DE FORMA INMEDIATA:

- **Ante ingestión accidental de medicación o toma de dosis errónea**
- **Si presenta alguna reacción tras la toma del medicamento**
- **Debe siempre indicar qué ha tomado, llevar el medicamento**
- **Informe de cualquier reacción a un medicamento**



Acceso a video